

がん種		レジメン名称			
胃がん		S1+CDDP療法			
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	生食	500mL	Div	Day8	ルートキープ プライミング
Rp2	ソリタ-T3号輸液 硫酸Mg補正液	500mL 1mEq/mL 1/2A	Div	Day8 1時間で	
Rp3	アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	Div	Day8 30分で	
Rp4	生食 シスプラチン点滴静注液	500mL 60mg/m ²	Div	Day8 2時間で	CDDP入れる分 だけ生食を抜く
Rp5	ソリタ-T3号輸液 硫酸Mg補正液	500mL 1mEq/mL 1/2A	Div	Day8 1時間で	
Rp6	20%マンニトール注射液	200mL	Div	Day8 30分で	
Rp7	リナセートF輸液	500mL	Div	Day8 緩徐に	
Rp8	生食シリンジ	10mL	iv	Day8	CVポート フラッシュ用
Rp9	エスワンタイホウ配合OD錠	<1.25m ² 40mg/回 1.25~1.5 50mg/回 1.5m ² > 60mg/回	1日2回 朝・夕食後 P.O	Day1夕 -22朝	Day22夕 -35朝は休薬
Rp10	アプレピタントカプセル125mg アプレピタントカプセル80mg	Day8 125mg Day9-10 80mg	P.O	Day8 Day9-10	支持療法
Rp11	デカドロン4mg	8mg/2回 朝・昼	P.O	Day9-11	支持療法

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m²,AUCで記載して下さい

インターバルの日数	14日間(1コース35日間)	総コース数	4コース
次のコースまでの標準期間	5週ごと		

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター