

がん種 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん 結腸がんにおける術後補助化学療法		レジメン名称 CapeOX法			
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	5%糖液	250mL	Div	プライミング Day1	オキサリプラチン 終了後フラッシュ にも使用
Rp2	アロキシ点滴静注バッグ デキサート注	0.75mg/50mL 6.6mg	Div	30分 Day1	
Rp3	5%糖液	50mL	Div	Day1 全開	アロキシ フラッシュ用
Rp4	オキサリプラチン注射液 5%糖液	130mg/m ² 500mL	Div	Day1 2時間で	
Rp5	生食シリンジ	10mL	iv	Day1	CVポート フラッシュ用
Rp6	カペジタビン錠300mg	1000mg/m ² /回	朝・夕食後 P. O	Day1(夕) ～15(朝)	Day15(夕) ～22(朝) は休業
Rp7	デカドロン4mg	8mg/2回 朝・昼	P.O	Day2-3	支持療法

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m²,AUCで記載して下さい

インターバルの日数 次のコースまでの標準期間	3週間ごと繰り返す	総コース数 病巣増悪または 患者状態悪化で中止
---------------------------	------------------	-------------------------------

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター