

| がん種 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん 結腸がんにおける術後補助化学療法 | | レジメン名称 CapeOX法+ベバシズマブ併用療法 | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 投与日 (Day1・Day8等) | コメント |
| Rp1 | ベバシズマブBS点滴静注用 生食 | 5mg/kg 100mL | Div | Day1 90分 | 10mg/kg の場合あり |
| Rp2 | アロキシ点滴静注バッグ デキサート注 | 0.75mg/50mL 6.6mg | Div | Day1 30分 | |
| Rp3 | 5%糖液 | 100mL | Div | Day1 | アロキシ フラッシュ用 オキサリプラチン プライミング |
| Rp4 | オキサリプラチン点滴静注液 5%糖液 | 130mg/m ² 500mL | Div | Day1 2時間で | |
| Rp5 | 生食シリンジ | 10mL | iv | Day1 | CVポート フラッシュ用 |
| Rp6 | カペジタビン錠300mg | 1000mg/m ² /回 | 朝・夕食後 P. O | Day1(夕) ~15(朝) | Day15(夕) ~22(朝) は休業 |
| Rp7 | デカドロン4mg | 8mg/2回 朝・昼 | P.O | Day2-3 | 支持療法 |

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m²,AUCで記載して下さい

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| インターバルの日数 次のコースまでの標準期間 | 3週間ごと繰り返す | 総コース数 病巣増悪または 患者状態悪化で中止 |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター