

がん種 慢性リンパ性白血病		レジメン名称 BENDA療法			
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	アロキシバッグ	0.75mg/50ml	Div	Day1 10分で	
Rp2	アプレピタントカプセル125mg アプレピタントカプセル80mg	125mg 80mg	P. O	Day1 Day2～3	
Rp3	トレアキシン点滴静注用 蒸留水 生食	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	Div	Day1・2 1時間で	1V当たり40ml の蒸留水で 溶解後生食 全量250mlに調整
Rp4	生食	20mL	iv	Day1・2 緩徐に	
			トレアキシン施行終了後26日間は休薬		

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m<sup>2</sup>,AUCで記載して下さい

インターバルの日数 次のコースまでの標準期間	3週ごと(休薬26日間) (高齢者4週ごと)	総コース数 寛解まで(1～2コースで評価)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター