

がん種		レジメン名称			
NHL・ATL		CHOP変法(エンドキサン+ピノルビン+フィルデシン)			
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	アロキシバグ	0.75mg/50ml	Div	Day1 10分で	
Rp2	アプレピタントカプセル125mg アプレピタントカプセル80mg	125mg 80mg	P. O	Day1 Day2~3	
Rp3	注射用エンドキサン 生食	750mg/m <sup>2</sup> 500mL	Div	Day1 2~3時間で	
Rp4	ピノルビン注射用 蒸留水	50mg/m <sup>2</sup> 20~40mL	iv	Day1 緩徐に	
Rp5	注射用フィルデシン 生食	2.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	iv	Day1 緩徐に	最大3mg
Rp6	水溶性プレドニン20mg 生食	100mg/body 20mL	iv	Day1 緩徐に	プレドニン錠 Day1~5 の場合あり
Rp7	プレドニン錠5mg	100mg/body	P. O	Day2~5	

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m<sup>2</sup>,AUCで記載して下さい

インターバルの日数 次のコースまでの標準期間	4週に1回	総コース数 寛解まで(1~2コースで評価)
---------------------------	-------	--------------------------

注意)公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター