

がん種 再発・難治性NHL	レジメン名称 R-BENDA療法
------------------	---------------------

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	リツキシマブ注 生食	375mg/m ² 1000mL	Div	Day2 3時間以上で	リツキシマブの 濃度を1mg/ml に調整
Rp2	カロナール錠500mg ポララミン錠2mg	1錠/body 3錠/body	P. O	Day2	リツキシマブ投与 30分前に
Rp3	アロキシバグ	0.75mg/50ml	Div	Day1 10分で	
Rp4	アプレピタントカプセル125mg アプレピタントカプセル80mg	125mg 80mg	P. O	Day1 Day2~3	
Rp5	トレアキシン点滴静注用 蒸留水 生食	120mg/m ² 250mL	Div	Day1・2 1時間で	1V当たり40ml の蒸留水で 溶解後生食 全量250mlに調整
Rp6	生食	20mL	iv	Day1・2 緩徐に	
			トレアキシン施行終了後19日間は休薬		

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m²,AUCで記載して下さい

インターバルの日数 次のコースまでの標準期間	3週ごと(休薬19日間) (高齢者4週ごと)	総コース数 寛解まで(1~2コースで評価)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター